

# 대장내시경 안내문(레디프리산)

성명 : 예약시간 : 월 일 (오전) (오후) 시 분

## 1. 검사전 준비사항

▶ 준비물 : 총 레디프리산 A제-4포, B제-4포, 가소콜 1포, 둘코락스 2알

※ 오전/오후검진 시, 대장약 복용법이 다르므로 내원 시간확인 후 복용하시기 바랍니다.

검진 7일 전부터

▶ 아스피린제, 혈전용해제, 철분제제는 중단하시기 바랍니다.  
(※ 주치의, 처방의사와 중단 가능 여부를 꼭 상의하세요!)

검진 3일 전부터

▶ 씨 있는 과일(키위, 메론, 참외, 포도, 수박, 딸기), 해조류(김, 미역), 곡류(현미, 흑미) 등을 드시지 마시고, 일반식사를 하십시오.  
— 추천음식 : 백미, 두부, 감자, 계란, 된장국(찌개), 맑은국(무국), 생선, 빵, 우동, 알맹이 없는 주스

## 2. 검사 전날 식사방법

검진 전날 식사방법  
(오전 대장예약자)

▶ 아침 : 가벼운 일반식  
▶ 점심 : 가볍게 미음 또는 흰죽을 반찬 없이 드십시오 (아침햇살, 두유 가능)  
▶ 저녁 : 금식 (생수는 드셔도 됩니다)

검진 전날 식사방법  
(오후 대장예약자)

▶ 아침, 점심 : 가벼운 일반식  
▶ 저녁 : 가볍게 미음 또는 흰죽을 반찬 없이 드십시오 (아침햇살, 두유 가능)

## 3. 레디프리산 조제법 및 복용방법

### ① 레디프리산 조제법

A제 1포와  
B제 1포를  
동봉된 500ml 용기에  
넣고 차가운 물을  
표시선까지 채운 후  
흔들어 줍니다.



### ② 레디프리산 복용법

①의 과정에서 조제한  
레디프리산 용액 500ml를  
250ml씩 15분 간격으로  
총 2번으로 나누어  
복용합니다.



## 4. 오전에 검사하시는 분

### ① 오후 7시에 둘코락스 2알을 먼저 복용



### ② 검진 전날 저녁 7시



조제한 레디프리산 500ml × 2통을 1시간  
동안 복용합니다. 추가로 생수 1L를 마십니다.

### ③ 검진 당일 오전 4시



전날 저녁과 동일하게 복용하고, 마지막으로  
가소콜 1포를 복용합니다.  
(※ 그 이후로는 물도 드시지 마십시오.)

## 5. 오후에 검사하시는 분

### ① 오전 5시에 둘코락스 2알을 먼저 복용



### ② 검진 당일 오전 5시



조제한 레디프리산 500ml × 2통을 1시간  
동안 복용합니다. 추가로 생수 1L를 마십니다.

### ③ 검진 당일 오전 7시



1차 방법과 동일하게 복용하고, 마지막으로  
가소콜 1포를 복용합니다.  
(※ 그 이후로는 물도 드시지 마십시오.)

## 내시경 전 중단해야 할 약물

- 1. 아스피린, 항응고제(와피린), 항혈소판제**는 심근경색이나 뇌출증 등의 혈관질환이 있을 경우 임의로 중단하면 위험할 수 있습니다. 중단여부에 대해 담당의사와 반드시 상의 후 1주일 정도 중단합니다.
- 2. 호흡기 질환, 간경화, 뇌질환, 신장이나 심장질환, 출혈성질환, 약물에 대한 과민반응, 최근 수술 여부, 감염성질환이** 있는 분도 반드시 담당의사와 미리 상의하셔야 합니다.
- 3. 대장내시경 전처치제를 모두 복용**하셔야만 검사가 가능합니다.

※ 만 70세 이상 수면 내시경 불가

### 검진 전 주의사항

- 검사전날 물 대신 적색 또는 포도색의 착색음료, 탄산음료는 절대 드시면 안됩니다.
- 검사전날과 당일 아침에 물 같은 변이 나와야 장 정결이 잘 된 것입니다. 모두 배변 하십시오.
- 약은 반드시 정해진 시간에 드셔야 하며, **대장정결이 안되었을 경우 추후 재검사 (추가 비용 발생)**를 하실 수도 있습니다.

### → 대장내시경검사는

대장 점막의 표면이 노출되도록 씻어내어 시야를 확보하는 준비 과정의 장 정결이 꼭 필요하며, 매우 중요합니다. 장 정결이 불량하여 대변이 제거되지 않았거나 시야를 확보 할 수 없는 경우에는 정확한 검사가 불가능하며, 이로 인해 **재검사 비용이 추가 발생될 수 있습니다.**

- 2주 이내 비행계획이 있으시면, 시술(조직검사)이 제한이 될 수 있습니다.
- 용종크기에 따라 출혈의 위험성이 있는 병변의 경우 타병원에서 용종절제술이 진행 될 수 있습니다. ★**조직검사, 용종절제술 시행 시 추가 비용이 발생될 수 있습니다.**
- 고혈압이 있으신 분은 검사 당일 레디프리산을 모두 복용하신 후 소량의 물과 함께 복용 하세요.
- 당뇨환자 중 당뇨약이나 인슐린 주사를 맞으시는 분은 검진 당일 주사를 맞지 마시고, 당뇨약도 드시지마세요.
- 아스피린, 쿠마딘과 같은 항응고제를 복용하거나 녹내장, 전립선 비대증이 있으신 분은 검사 전에 미리 말씀해주세요.

### 검진 후 주의사항

- 조직검사를 한 경우에는 대변에 피가 조금 섞여 나올 수 있습니다만, 보통은 곧 멈춥니다.
- 평소 **아스피린** 드시던 분은 조직검사를 할 경우, 담당의사와 복용시기를 다시 상의한 후 결정해야 합니다.
- 공기에 의한 복부팽만으로 인해 복통이 있을 수 있으나, 가스를 배출하면 편해집니다.
- 수면유도제 때문에 약간 어지러울 수 있습니다.
- 검사 당일에는 운전을 하거나 기계를 다루거나 중요한 결정을 내리는 일은 삼가하십시오.

수면 내시경은 마취한 상태에서 시행하는 것이 아니며,  
환자의 협조가 가능한 진정상태에서 시행합니다.



※ 문의사항 : 고객센터 ☎ 1644-0808